

Lösung Übung 4

① (a)

$$\frac{1}{h} (e^{A(t+h)} - e^{A(t)}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{1}{h} (A(t+h)^k - A(t)^k) = (*)$$

NR:

$$\frac{1}{h} (A(t+h)^k - A(t)^k) = \frac{1}{h} [A(t+h)^{k-1} \cdot (A(t+h) - A(t)) +$$

$$+ (A(t+h)^{k-1} - A(t)^{k-1}) \cdot A(t)] = \dots =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{h} \sum_{j=0}^{k-1} A(t+h)^j (A(t+h) - A(t)) A(t)^{k-j-1} \\ &= \frac{1}{h} (A(t+h) - A(t)) \cdot \sum_{j=0}^{k-1} A(t+h)^j A(t)^{k-j-1} \end{aligned}$$

$$[A(t+h), A(t)] = 0$$

$$= \sum_{j=0}^{k-1} A(t+h)^j A(t)^{k-j-1} \cdot \frac{1}{h} (A(t+h) - A(t))$$

$$\begin{aligned} \text{Damit } \frac{d}{dt} A(t)^k &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (A(t+h)^k - A(t)^k) = A'(t) \cdot \sum_{j=0}^{k-1} A(t)^{k-j-1} \\ &= k A'(t) A(t)^{k-1} \\ &= k A(t)^{k-1} A'(t). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Somit } (*) &\xrightarrow{(h \rightarrow 0)} A'(t) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \lim_{h \rightarrow 0} A(t+h)^{k-1} = A'(t) e^{A(t)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} k \cdot A(t)^{k-1} A'(t) = e^{A(t)} A'(t) \end{aligned}$$

(Man kann $\lim_{h \rightarrow 0}$ und $\sum_{k=1}^{\infty}$ vertauschen, da die Reihe gleich konvergiert.)

$$(b) \quad x(0) = e^{U(0)} x_0 = e^0 x_0 = E \cdot x_0 = x_0 .$$

$$\dot{x}(t) = U(t) e^{U(t)} x_0 = A(t) e^{U(t)} x_0 = A(t) x(t) \quad \checkmark$$

(c) $e^{U(t)}$ ist regulär, x_0 ist regulär $\Rightarrow e^{U(t)} x_0$ ist regulär. Weiter $(e^{U(t)} x_0)' = U'(t) e^{U(t)} x_0$

$$= A'(t) e^{U(t)} x_0 .$$

$$(d) \quad x(0) = e^{U(0)} (x_0 + 0) = x_0 .$$

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= U'(t) e^{U(t)} \left(x_0 + \underbrace{\int_{t_0}^t e^{-U(t')} b(t') dt'}_{=x(t)} \right) \\ &+ \underbrace{e^{U(t)} \cdot e^{-U(t)} b(t)}_{=E} \\ &= A(t) x(t) + b(t) . \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$(2) \quad A \text{ hermitesch} \Leftrightarrow A^* = A \Leftrightarrow (iA)^* + iA = 0$$

$$\Leftrightarrow iA \in u(n) = u_E(n)$$

$$\Leftrightarrow t \mapsto e^{t \cdot iA} : \mathbb{R} \longrightarrow u(n) = u_E(n)$$

$$\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R} : e^{tiA} \text{ unitär.}$$

$$(3) \quad A^* G + GA = 0 \Rightarrow A \in u_G(n). \quad \text{Dann ist}$$

$$\text{für alle } t \in \mathbb{R}: \quad u(t) = e^{t \cdot A} \in u_G(n) . \quad \text{Insbesondere}$$

gilt:

$$1 = |\det e^{t \cdot A}| = |e^{t \cdot \operatorname{Spur} A}| = e^{t \cdot \operatorname{Re Spur} A} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re Spur} A = \log 1 = 0$$

④ (a)

$$\dot{x}_{a,b}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(a-t) & t \leq a \\ 0 & a \leq t \leq b \\ \frac{1}{2}(t-b) & b \leq t \end{cases}$$

$$\sqrt{|x_{a,b}(t)|} = \begin{cases} \frac{1}{2}|a-t| = \frac{1}{2}(a-t) & t \leq a \\ 0 & a \leq t \leq b \\ \frac{1}{2}|t-b| = \frac{1}{2}(t-b) & b \leq t \end{cases}$$

$x_{a,b}(0) = 0$. Damit sind $x_{a,b}$ Lösungen.

(b) $f(y) = \sqrt{|y|}$ erfüllt bei 0 keine lokale Lipschitz-Bedingung: Es gilt

$$\frac{\sqrt{1/k}}{1/k} = \sqrt{1/k} \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty),$$

obwohl $\sqrt{k} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$. Damit ist

$$\begin{aligned} \infty &= \sup_{k \geq 1} \left| \frac{f(1/k) - f(0)}{1/k - 0} \right| \\ &\leq \sup_{|x|, |y| < \delta} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right|, \end{aligned}$$

aber die rechte Seite wäre $\leq L$, falls

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \text{für } x, y \in [-\delta, \delta]$$

gäten würde.